

## 42. Emiste kasutamise efektiivsus

*Sow using effectiveness*

			Kasutamine väljaminekuni <i>Using until culling</i>				Päevad pesakonna kohta <i>Days per litter</i>					
Farmi tüüp <i>Type of farm</i>	Aasta <i>Year</i>	Farmide arv no. <i>Farms</i>	pesakondade arv <i>no. of litters</i>	kasutusaastat <i>years</i>	võrutusest väljaminekuni, p <i>days from weaning to culling</i>	seemendusest väljaminekuni, p <i>days from insemination to culling</i>	kokku <i>total</i>	jõudluspäevi <i>performance days</i>	ebaproductiivseid päevi <i>nonproductive days</i>	ümberindluspäevi <i>days from insemination to return</i>	võrutusest väljaminekuni, p <i>days from weaning to culling</i>	seemendusest väljaminekuni, p <i>days from insemination to culling</i>
Baasaretusfarm <i>Nucleus herd</i>	2006	5	2,6	1,3	4,2	70,0	176,2	151,6	24,7	11,3	0,6	11,0
	2007	5	2,7	1,4	8,6	76,0	169,5	150,4	19,1	7,1	1,1	9,4
	2008	4	3,4	1,7	9,4	59,1	161,6	150,3	11,3	4,2	1,2	4,5
Aretusfarm <i>Breeding herd</i>	2006	37	3,3	1,8	10,6	74,5	175,7	152,8	22,9	11,8	1,4	9,0
	2007	33	3,3	1,7	11,8	79,5	175,5	152,5	23,0	11,6	1,5	8,8
	2008	32	3,4	1,8	11,9	79,5	174,5	151,8	22,7	10,8	1,8	9,0
Kokku <i>Total</i>	2007	38	3,2	1,7	11,6	79,2	175,0	152,3	22,7	11,2	1,5	8,9
	2008	36	3,4	1,8	11,8	78,6	173,7	151,7	21,9	10,4	1,7	8,7