

42. Emiste kasutamise efektiivsus

Sow using effectiveness

Farmi tüüp <i>Type of farm</i>	Aasta <i>Year</i>	Farmide arv no. <i>Farms</i>	Kasutamine väljaminekuni <i>Using until culling</i>				Päevad pesakonna kohta <i>Days per litter</i>					
			pesakondade arv <i>no. of litters</i>	kasutusaastat <i>years</i>	võrutusest väljaminekuni, p <i>days from weaning to culling</i>	seemendusest väljaminekuni, p <i>days from insemination to culling</i>	kokku <i>total</i>	jõudluspäevi <i>performance days</i>	ebaproductiivseid päevi <i>nonproductive days</i>	ümberrindluspäevi <i>days from insemination to return</i>	võrutusest väljaminekuni, p <i>days from weaning to culling</i>	seemendusest väljaminekuni, p <i>days from insemination to culling</i>
Baasaretusfarm <i>Nucleus herd</i>	2007	5	2,7	1,4	8,6	76,0	169,5	150,4	19,1	7,1	1,1	9,4
	2008	4	3,4	1,7	9,4	59,1	161,6	150,3	11,3	4,2	1,2	4,5
	2009	4	4,2	2,0	8,9	56,6	160,9	149,6	11,3	4,7	1,6	3,6
Aretusfarm <i>Breeding herd</i>	2007	33	3,3	1,7	11,8	79,5	175,5	152,5	23,0	11,6	1,5	8,8
	2008	32	3,4	1,8	11,9	79,5	174,5	151,8	22,7	10,8	1,8	9,0
	2009	30	3,5	1,8	10,8	69,0	173,5	151,1	22,4	12,2	1,4	7,5
Kokku <i>Total</i>	2008	36	3,4	1,8	11,8	78,6	173,7	151,7	21,9	10,4	1,7	8,7
	2009	34	3,5	1,8	10,6	68,6	172,8	151,0	21,8	11,8	1,4	7,3